

DMT [DET, DPT]

DMT je jedním z nejrychleji a nejintenzivněji působících halucinogenů. Objekty ztrácí veškerou formu, rozpadají se na hru vibrací, lze zažít transport do jiného vesmíru, setkání s cizími formami života, hudby, jazyků. Nejlepší pro trip je světlý pokoj, nikoli však přímé sluneční světlo (barvy jsou jinak neuvěřitelně intenzivní). Po návratu z hyperprostoru je dobré začít mluvit, myšlenky si případně zaznamenat na magnetofon. DMT bylo objeveno r. 1931, jeho halucinogenní efekty 1956. Nachází se v mnoha rostlinách, např. Mimosa hostilis (z jejích kořenů se dělá halucinogenní nápoj Jarema) nebo Ayahuasca (má psychotropní účinky, produkuje stavy s telepatickou zkušeností). Při intoxikaci se objevují mydriáza (rozšíření zorniček), tachykardie (zvýšený tlukot srdce), je těžké vyjádřit myšlenky a koncentrovat se. DMT značí N,N-dimetyl-tryptamin. Je podobný bufoteninu, blízký psilocybinu. Po svalové injekci dojde k náhlému rauši, který trvá 1 - 2 hodiny. Injekce do žíly nebo kouření působí ještě rychleji Průběh může být někdy zlý. Dávky se při inhalaci pohybují mezi 20 a 30 mg pro slabší a mezi 50 - 60 mg pro intenzivní trip, při kterém mohou už vstávat vlasy na hlavě. Měly by být přesně odváženy. DMT není bez inhibitorů orálně aktivní, je nutné jej kouřit a věnovat tomu náležitou pozornost, jinak je polovina pokusů neúspěšná a jako psychonaut se do hyperprostoru neprolomíte, uvidíte jen určité chryzantémové vzory. Je třeba mít DMT ve formě volné báze, nikoliv hydrochlorid a nejlépe použít uzavřenou skleněnou dýmku, ve které se kuličky roztaví. Pokud nestačí 30 s kouření, nemá cenu pokračovat (až po nejméně 1 h). Již při inhalaci se objevují intenzivní telesné pocity a slabost (výpary chutnají jako hořící plastik či rybí olej a nutí ke kašli), je vhodné sedět a mít kolegu pro další manipulaci s dýmkou. Trip začíná v prvních sekundách, vrcholí za 5 až 20 minut a trvá asi půl hodiny. Po jeho skončení lze aplikovat další halucinogen perorálně (LSD, MDM, MDA, psilocybin), jeho účinky se znásobí a umožní lépe porozumět vizím z DMT. Ptejte se svých dealerů, dávka 40mg se dá sehnat např. ve Frankfurtu za $35 (WOW!).

DET (dietyltryptamin) má tytéž účinky, jsou jemnější, podobné psilocybinu a trvají dvakrát déle.
DPT (dipropyltryptamin) působí stejně, má menší vedlejší účinky než DMT. Trip trvá delší dobu, podle dávky (15-30 mg: 1.5 - 2 h, 60 - 150 mg: 4 - 6 h).

JAK PEJSEK S KOČIČKOU PEKLI OŘÍŠKOVOU BÁBOVKU

1.
Pečlivě rozpustili 25 g indolu (děsně to smrdělo) s 450 gramy suchého etyl éteru v dvoulitrové flašce.
2.
Na tácu s ledem zchladili roztok na 0 stupňů Celsia (trvalo to asi půl hodiny) a zároveň ochladili 50 ml suchého oxalychloridu na asi -5 C.
3.
POMALU smíchali jedno s druhým. Látky byly divoce reaktivní!
4.
Počkali, dokud to nedobublalo a přidali na tác s ledem sůl pro další zchlazení. Výsledek si označili a uložili do lednice.
5.
Ochladili 100 ml suchého etyl éteru v půllitrové flašce na 0 C pomocí tácu s osoleným ledem. Zároveň udělali to samé s neotevřenou lahvičkou dimetylaminu.
6.
Pomalu a stabilním proudem vylili dimettylamin do éteru.
7.
Pomalu a pozorně smíchali výsledek s předchozí uschovanou směsí.
8.
Vyndali roztok z ledu a za stálého míchání počkali, dokud se neohřeje na pokojovou teplotu a dokud nebyl co nejčistší.
9.
Roztok přefiltrovali kvůli oddělení usazeniny sáním.
10.
Na usazeninu nalili technický éter a přefiltrovali se sáním znovu.
11.
Opakovali filtrování ještě jednou s éterem, pak dvakrát s vodou.
12.
Nechali substanci sušit na plastikovém nebo porcelánovém talíři. Částečky suchého pevného materiálu pak umístili do 800 ml kádinky.
13.
Rozmíchali 100 ml benzenu se 100 ml metylalkoholu a zalili tím částečky v kádince do výšky 1 - 1.5 cm. Kádinku zahřívali ve vodě, dokud se vše nerozpustilo (ve vodní lázni ji však nedávali přímo nad plamen).
14.
Odstavili kádinku od tepla a jak chladla, pozorovali, jak se objevují malé jehlovité krystaly. Zkoušeli odlít co nejvíce roztoku, aniž by je poškodili.
15.
Umístili krystaly v litrové láhvi a rozpustili je v tetrahydrofuranu. (Použili ho jen tolik, kolik bylo nezbytně nutné). Označili roztok A .
16.
Pomalu rozmíchali 200 ml tetrahydrofuranu a 20 gramů lithium alumumium hydridu v půllitrové flašce. (Mimochodem, lithium aluminium hydrid při kontaktu s vlhkostí vzplane. Chránili si oči a ruce.)
17.
Smíchali výsledek s roztokem A , pomalu, za stálého míchání.
18.
Připravili si vodní lázeň a tři hodiny roztok ohřívali, míchali po čtyři minuty každou hodinu. Když nemíchali, použili aspirační trubici.
19.
Nechali láhev v pokojové teplotě na dobu okolo 20 minut. Pak umístili do slané ledové lázně a ochladili na 0 C. Přidali malé množství ochlazeného metanolu a jemně míchali.
20.
Přefiltrovali roztok v trychtýři přes papírový filtr do láhve.
21.
Přidali 100 ml tetrahydrofuranu přes filtr do téže láhve. Zahřívali ve vodní lázni, dokud se většina tetrahydrofuranu nevypařila a nezůstala jim gumovitá substance.
22.
Látku umístili na tác a sušili teplometem tři až čtyři hodiny.

Jaké bylo jejich překvapení, když potom zjistili, že nemají oříškovou bábovku, ale dimetyltryptamin!

Extrakce směsi alkaloidů obsahujících DMT z přírodních zdrojů



DMT je obsaženo v listech trávy chrastice (Phalaris), u nás je běžně rostoucí chrastice rákosovitá (Phalaris arundinacea). Zjednoho kilogramu sušených listů je možno níže uvedeným způsobem získat 20-30 dávek (ale i míň, ale i víc).

Pěstování :
Při pěstování chrastice, ať už doma za oknem, nebo venku na zahrádce je možné několika způsoby zvýšit obsah alkaloidů. Je to stresování střiháním, stíněním a suchem.

Stříhání - počkej až budou rostliny alepoň 10 cm vysoké, pak ustřihni vrcholky listů, zpomalí se tím růst, ale obsah DMT se zvedne o 50 až 400%

Stínění - občasné stínění (o 10-20% méně běžného světla) zpomalí růst a zvýší obsah DMT asi o 30% -> nemá velkého významu.

Sucho - nezalévej asi 10 dnů, nebo dokud nezačnou usychat špičky listů, zvýší obsah DMT asi na dvojnásobek.

Půda příliš bohatá na minerály a dusičnany má přímo fatální důsledek na obsah alkaloidů v rostlině. Jejich nedostatek ale zase způsobuje pomalý růst a malý vzrůst. Nejvhodnější je málo výživná půda a hnojení pouze v počáteční fázi pěstování a to hnojivem dobře rozpustným ve vodě.

Extrakce :

1. - co možná nejdokonaleji rozmělni listy, je zapotřebí rozbít buněčnou strukturu rostliny
   - dobrá metoda je zmrazení na několik hodin a rozmrazení (opakovat 3x)
   - ještě zmrazené vloží do mixéru nebo jiného rozmělňovače

2. - před otevřením nech usadit prach nebo přijdeš o ty nejmenší a na alkaloidy nejbohatší částice
   - pak přidej tolik vody aby vznikla tekutá směs (kaše)

3. - do kaše přidávej po troškách nějakou slabou kyselinu dokud nedosáhneš PH okolo 5, dá se použít kyselina citronová (běžne dostupná v potravinách, nebo v drogerii), kyselina octová (ocet)
   - PH kontroluj lakmusovými papírky (taktéž relativně běžné v drogeriích)
   - kyselina reaguje s alkaloidy v listech a převádí na jejich sůl, pro podpoření reakce je možné směs zahřát na 50 stupňů a pak nechat reagovat přes noc, nebo zahřívat celou noc ale s pokličkou, aby jsi neztrácel tekutiny

4. - promačkej kaši přes plátno a kapalinu ještě přefiltruj přes papírový filtr na kávu, nebo jiný hustý papírový filtr
   - zbytky na plátně a na filtru můžeš zahodit, všechny alkaloidy jsou nyní ve vodném roztoku

5. - přidej malé množství (asi 1/10 objemu tvého roztoku) odmašťovacího rozpouštědla (methylen chlorid, ether, chloroform, toluen,...)
   - všechny nežádoucí tuky a oleje obsažené v roztoku se rozpustí v rozpouštědle
   - důkladně protřepávej směs několik minut a pak nech odstát dokud nevzniknou dvě vrstvy, vodní a rozpouštědlo

6. - v další fázi se hodí oddělovačka (k dostání v obchodech s laboratorním sklem)
   - je zapotřebí oddělit vodní fázi (obsahující alkaloidy) od rozpouštědla, které můžeš zahodit

7. - nyní se přidá do roztoku zásada
   - můžeš použít hydroxid amonný (čpavková voda), nebo roztok hydroxidu sodného, draselného ...
   - přidávej zásadu po malých troškách, důkladně zatřepej a kontroluj PH dokud nedosáhněs hodnoty 9-10
   - nyní se alkaloidy převedly na formu ve vodě nerozpustnou avšak rozpustnou v rozpouštědle

8. - přidej asi 1/10 objemu výše uvedeného organického rozpuštědla a důkladně, velmi důkladně protřepávej několik minut v dobře uzavřené nádobě
   - nech stát 24 hodin a poté odděl vrstvu rozpuštědla, která obsahuje alkaloidy
   - ve vodném roztoku ještě stále něco zbylo, takže je možné extrakci opakovat (až 3x), ovšem je zapotřebí směs nechat déle stát (asi týden) a protřepávat alespoň 2x denně

9. - v poslením kroku dej získané rozpouštědlo do mělké nádoby a nech odpařit na otevřeném místě. Zbytek co zůstane na dně je DMT.

Užití :
Takto připravené DMT je vhodné ke kouření. Neexistuje ale jednoduchý způsob jak zjistit kolik ho je ve výsledné směsi obsaženo. Začínej tedy s malými dávkami (asi 25 mg), a zvojnásobuj dokud nedosáhneš žádaného efektu. Kouří se buť ve speciální dýmce (jako na THC olej), nebo se rozpustí v alkoholu a napustí se do nějakého rostlinného materiálu jako je tabák, bylinky, oregáno, tráva ...
Samotné DMT není aktivní orálně. Je zapotřebí nějaký MAO inhibitor. Nejvhodnějším se zdá být harmalin obsažený s semenech syrské routy (Peganum Harmala). Stačí normální dávka DMT užitá spolu se třemi gramy semen routy a směs se stane aktivní orálně, účinky se prodlouží asi na 4 až 6 hodin.

ROZDĚL SE

Odborníci se chovají k drogám s úctou a neustále zdůrazňují nebezpečí plynoucí z jejich nesprávného užívání. Je znám případ mladíka se slabou duší , který nenasytně požíral halucinogenní ayahuascu a nepomyslel vůbec na ostatní lidi, se kterými by se měl podělit. Brzy spatřil, jak všem okolo vyrůstají rohy a ocasy. Pak se objevil obrovitý léčitel a řekl mu: Budeš schopen cestovat pod zemí, vzduchem i vodou, půjdeš-li k těhotné ženě, spící uvnitř tohoto domu. Zabij ji mačetou, vyjmi z ní dítě, rozsekni mu hlavu a vyssaj jeho mozek. Po strašlivém děsu, který jeho čin vyvolal, přijela policie a všichni byli odsouzeni k dlouholetému vězení.

ROZDĚL SE

Tento materiál není v žádném ze svých významů míněn jako nabádání k užívání či výrobě drog a psychotropních látek. Tento materiál není určen k veřejnému šíření a vlastníci autorských práv tímto povolují každému jednotlivci vytvořit si maximálně jednu jeho xerografickou kopii (na kopírce) pro vlastní potřebu.
Všechny uvedené informace jsou neověřené a jejich použití (špatné i správné) může vést k poškození zdraví a psychické nestabilitě.